

ÖSSZETÉTEL

Nátrium-klorid, nátrium-dihidrogén-foszfát-dihidrát, vízmentes dinátrium-foszfát, nátrium-hialuronát, tisztított víz.

TARTÓSÍTÓSZER-MENTES

ALKALMAZÁS CÉLJA

A **Vizol S 0,21% FAST RELIEF** szemcsepp száraz szemre az **enyhe szemszárazság** tüneteinek kezelésére szolgáló készítmény.

A **Vizol S 0,4% LONG EFFECT** szemcsepp száraz szemre a **súlyos szemszárazság** tüneteinek kezelésére szolgáló készítmény.

A szemcseppek védik, nedvesítik és síkosítják a szemet. Alkalmazásuk gyorsan enyhíti a kellemetlen tüneteket.

A szemszárazság csökkenthető, és ezáltal a szövődmények megelőzhetőek.

Szemszárazságot okozhatnak a következő tényezők:

- a könnyfilm könnyhiány vagy a könny túlzott párolgása által kiváltott károsodása, amely a szemfelszín sérülését és kellemetlen érzést okozhat
- környezeti tényezők (központi fűtés, légkondicionálás, fénycsőves világítás, füst és szél)
- hosszas számítógép-használat
- dekongesztáns szemcseppek alkalmazása
- öregedés (a 65 évesnél idősebb populáció 75% szenved száraz szem szindrómában)
- kontaktlencse-viselés
- szemsebészeti beavatkozások vagy a szem sérülése
- nem (a nőket érintő hormonális változások: terhesség, szoptatás, menstruáció vagy menopauza)
- gyógyszerhasználat (antidepresszánsok, vérnyomáscsökkentők, fogamzásgátlók)
- bizonyos betegségek (rheumatoid arthritis, diabétesz, asztma, pajzsmirigy-rendellenességek, glaukóma)

A **Vizol S 0,21% FAST RELIEF** szemcseppet kontaktlencse-viselők is alkalmazhatják.

A **Vizol S 0,4% LONG EFFECT** szemcsepp viszkózus állaga elősegíti, hogy a nátrium-hialuronát tartósabban megmaradjon a szemfelszínen, így hosszabb ideig tartó nedvesítést és fokozott védelmet biztosít. A **Vizol S 0,4% LONG EFFECT** szemcsepp alkalmazásakor ajánlatos a kontaktlencsét kivenni, és 15 perccel a cseppentés után visszahelyezni.

A nátrium-hialuronát megtalálható a csarnokvízben és az üvegtest-folyadékban.

A **Vizol S** szemcsepp száraz szemre készítményekben lévő nátrium-hialuronát minden egyes pislantáskor védőréteget képez a szemfelszínen, megszüntetve a szárazságot, a homokszemérzést és az irritációt.

A kezelőorvossal való konzultációt követően a **Vizol S** szemcseppek alkalmazhatók szemsebészeti beavatkozások után, valamint olyan típusú szemszárazság esetén is, amelyet gyulladáscsökkentő szemkészítmények alkalmazása vált ki.

FIGYELMEZTETÉSEK

Ne alkalmazza a **Vizol S** szemcseppeket:

- a nátrium-hialuronáttal vagy a **Vizol S** szemcseppek bármely más összetevőjével szembeni túlérzékenység (allergia) esetén.

Ha allergiás reakciót észlel, azonnal hagyja abba a készítmény használatát és forduljon orvoshoz!

Egyéb megjegyzések:

- Ne használja a készítményt, ha észreveszi, hogy a szemcsepp flakonja vagy applikátora sérült.
- A biztonságos alkalmazás és higiénia érdekében a flakont csak egyetlen személy használja!
- A **Vizol S** szemcseppek és kontaktlencse-folyadékok, más szemcseppek vagy helyileg alkalmazott szemkenőcsök között kölcsönhatás nem ismert. Ha más szemkészítményt is alkalmaz, legalább 15 percet várjon a két adagolás között.

Megjegyzés:

A **Vizol S 0,4% LONG EFFECT** a látás pillanatnyi elhomályosulását okozhatja. Tartózkodjon a járművezetéstől vagy gépek működtetésétől mindaddig, amíg látása ismét kitisztul.

A KÉSZÍTMÉNY BIZTONSÁGOSSÁGA

A cseppentő technológia tartalmaz egy szűrőt, amely megakadályozza az oldat szennyeződését a felbontást követően, ezáltal **biztonságossá teszi a készítmény alkalmazását**.

A készítmény tartósítószerrel nem tartalmaz, így csökken az irritáció és a szemfelszín károsodásának esélye.

A készítményt általában jól tolerálják a betegek. Ha mégis mellékhatást tapasztalna, forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez!

SZEMCSEPP


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN!

ADAGOLÁS


A készítmény szükség szerint naponta többször alkalmazható. Megfelelően alkalmazva egy flakon 30 napra elegendő. Tartós használat esetén konzultáljon orvosával.

Cseppentsen 1-2 cseppet a szembe, majd többször pislantson, ezáltal biztosítva az oldat egyenletes eloszlását a szem felületén.


A készítmény tartósítószeret nem tartalmaz, ezért alkalmazása nem károsítja a szemet.




1. Távolítsa el a kupakot a pumpáról.



2. A 2. ábrán látható kétféle fogás közül az egyiket választva fogja kezébe a pumpát.



3. Fordítsa fejjel lefelé a tartályt, és nyomással aktiválja a pumpát, míg meg nem jelenik az első csepp.



4. Tartsa fejjel lefelé a tartályt, majd a pumpát megnyomva cseppentsen az előírt számú cseppet a szembe.

PRÓBÁLJA KI A VIZOL S TERMÉKCSALÁD EGYÉB SZEMCSEPPJEIT:

KÉSZÍTMÉNY	JAVALLAT	ÖSSZETÉTEL	AZ ÁLLAPOT KIVÁLTÓ OKAI	ALKALMAZÁS	KONTAKTLENCSÉ MELLETT ALKALMAZHATÓ	ALKALMAZÁS UTÁNI ÉRZÉS
Vizol S 0,21 FAST RELIEF	Enyhe szemszárazság kezelésére	Nátrium- hialuronát 0,21%	Hosszan tartó számítógép-használat, autóvezetés és utazás okozta szemfáradtság, kontaktlencse-viselés, allergia, idegen test, környezeti tényezők (száraz levegő, füst)		IGEN	Azonnali enyhülés és felfrissülés. Hosszan tartó nedvesség-érzet.
Vizol S 0,4 LONG EFFECT	Súlyos szemszárazság kezelésére	Nátrium- hialuronát 0,4%	Agresszív környezeti tényezők (szél, nap, száraz levegő), központi fűtés és légkondicionálás, öregedés, gyógyszeres kezelés	1-2 csepp a szembe, szükség szerint naponta többször	NEM	Azonnali enyhülés és tartós nedvesítés. Hosszan tartó komfort- és síkosság-érzet. Az alkalmazás a látás pillanatnyi elhomályosulását okozhatja.
Vizol S INTENSIVE	A szemszárazság enyhítésére és a szemfelszín regenerálására	Nátrium-hialuronát 0,15% Dexpantenol 2%	Mechanikus eredetű szem-irritáció: kontaktlencse-viselés, sebészeti vagy diagnosztikai beavatkozás, gyógyszerszedés		IGEN	Azonnali felfrissülés és hosszan tartó komfort-és nedvesség-érzet.

GYÁRTÓ



JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d. d. Svilno
20, 51000 Rijeka, Horvátország

LEJÁRATI IDŐ

A csomagoláson feltüntetve.

Felnyitás után 180 napig használható fel.

Ne alkalmazza a készítményt a lejárati időn túl!

TÁROLÁS

30°C alatt az eredeti csomagolásban.

Gyermekek elől elzárva tartandó!

CSOMAGOLÁS

10 ml



FELÜLVIZSGÁLAT IDŐPONTJA

2021. április

A CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETETT SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA



Olvassa el a használati útmutatót!



Gyártó



Lejáratí idő



Tárolási hőmérséklet felső
határa



Gyártási szám



CE jelölés



Steril, aszeptikus gyártási technológiával készült



Figyelem! Olvassa el a használati útmutató „Figyelmeztetések” fejezetét!

	Vizol S 0,21% FAST RELIEF	Vizol S 0,4% LONG EFFECT
A dobozon található további szimbólumok:	Hosszas számítógép-használat okozta szemszárazság azonnali enyhítése	Nedvesítés és védelem súlyos szemszárazság esetén
	Autóvezetés és utazás okozta szemfáradtság enyhítése és nedvesítés	Aszemirritáció azonnali enyhítése és hosszan tartó hatás
	Kontaktlencse-viselés okozta kellemetlen érzés és irritáció enyhítése	Aszem nedvesítése és védelme száraz levegőjű és légkondicionált helyiségekben
	Felnyitást követő lejárati idő 6 hónap	Felnyitást követő lejárati idő 6 hónap